

فینل افرین

۲/۵ درمرد و ۵/۵ درمرد

قبل از مصرف دارو، بروشور را به دقت مطالعه کنید.

موارد مصرف دارو:
دسته دارویی؛ شد احتقان و تنگ کننده عروق

ببینی
شکل دارویی؛ قطره استرین بینی
چیت تسکین موقت احتقان و گرفتگی بینی
ناشی از سرماخوردگی، سینوزیت و حساسیت‌های خفیف.
مکانیسم عملکرد فینل افرین، کاهش شدت واکنش‌های حساسیتی و رفع احتقان بینی است که در اثر تحریک گیرنده‌های آلفا و انقباض عروق بینی ایجاد می‌شود.

راهنمای‌های عمومی:

فینل افرین برای بیماری‌های فعلی شما مجوز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

هشدارها:

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

مصرف فینل افرین در کودکان زیر ۱۲ سال تنها با تشخیص پزشک مجاز است.
در صورتی که درپوش ظرف قبلا باز شده است، از مصرف آن جدا خودداری نمایید.
حداکثر دوره مصرف فینل افرین ۷۲ ساعت است.

موارد احتیاط و منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به فینل افرین یا هر یک از مواد جانبی ذکر شده در بخش مشخصات دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف فینل افرین در مبتلایان به گلوکوم، بیماری‌های قلبی-عروقی، هایپرتانسیون، اختلالات تیروئید، اختلالات پروستات و یا سایرۀ اپتا به آن، توصیه نمی‌گردد.
استفاده بیش از حد از فینل افرین ممکن است منجر به احتقان برگشتی شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری و یا تصمیم برای باردار شدن پیش از مصرف فینل افرین از پزشک یا داروساز خود مشورت بخواهید.
مصرف فینل افرین در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها، حتما پزشک خود را مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌کند، اما مقدار مصرف معمول **فینل افرین** به شرح زیر است:

کودکان ۶ تا ۱۲ سال: ۳-۲ قطره از محلول ۰/۲۵ درمرد، هر ۴ ساعت یکبار در هر سوراخ بینی.
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۱۲ سال: ۳-۲ قطره از محلول ۰/۲۵ درمرد یا ۵/۵ درمرد، هر ۴ تا ۳ ساعت یکبار در هر سوراخ بینی.

نحوه صحیح مصرف دارو:

پیش از مصرف قطره دستان خود را بشویید.

قبل از استفاده، بینی خود را به آرامی با زردم هوا تخلیه کنید.

پس از باز کردن درپوش بطری، بطری را بین انگشت شست و انگشت وسط نگه داشته، سر را مطابق یکی از شکل‌های زیر متمایل کرده و به آرامی به انتهای بطری فشار وارد نمایید. سر را برای چند دقیقه در همان وضعیت نگه‌دارید.



درپوش بطری را بلافاصله پس از استفاده محکم ببندید.

در صورت فراموشی هر نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود، مطابق روال قبل دارو را مصرف نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موارات آثار درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض زیر یا عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید گردیده است دارو را قطع و با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

احساس تنگی نفس، درد قفسه سینه، ضربان سریع یا نامنظم قلب، سوزش، خارش، آبریزش یا تحریک بینی، اختلال در دید، تهوع، سردرد، سرگیجه، تبوع، تعریق شدید، خواب‌آلودگی و ضعف عمومی.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

حداکثر زمان نگهداری دارو پس از باز شدن چهار هفته است.

مشخصات دارو:

هر ۱ میلی‌لیتر از محلول قطره استرین بینی حاوی ۲/۵ میلی‌گرم (۰/۲۵ درمرد) و ۵ میلی‌گرم (۰/۵ درمرد) ماده موثره فینل افرین هیدروکلراید می‌باشد. سایر مواد جانبی شامل بنزالکونیوم کلراید، سدیم کلراید، تری‌سدیم سیترات دی‌هیدرات، سیتریک اسید آنهیدروز و آب قابل تزریق (water for injection) می‌باشد. در یک حبه حاوی ۱۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۲۵ درمرد یا ۱۰ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان و درپوش استرین می‌باشد.



ساخت شرکت داروسازی نوآوری زیستی
ایران - ابریز

INCLON

PHENYLEPHRINE

0.25% and 0.5%

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because you contain important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as instructed by your doctor or pharmacist.
- If you need more information or advice, ask your pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If you experience any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet:

1. What PHENYLEPHRINE drops are and what they are used for
2. What you need to know before you use PHENYLEPHRINE drops
3. How to use PHENYLEPHRINE drops
4. Possible side effects
5. How to store PHENYLEPHRINE drops
6. Contents of the pack and product description

1. What PHENYLEPHRINE drops are and what they are used for

Category: Decongestant
PHENYLEPHRINE drops contain phenylephrine hydrochloride which belongs to a group of medicines called decongestants. Phenylephrine nasal help relieve a blocked or stuffy nose caused by cold, hay fever, sinus infection or other allergic reactions.

2. What you need to know before you use PHENYLEPHRINE drops

Caution

Do not use PHENYLEPHRINE if you are:
• Allergic (hypersensitive) to phenylephrine hydrochloride or to any of the other ingredients in this medicine.

Take special care with PHENYLEPHRINE drops:

- Do Ask a doctor or pharmacist if it is safe for you to take PHENYLEPHRINE nasal if you have other medical conditions, especially heart disease, high blood pressure, thyroid disorders, or urination problems caused by an enlarged prostate.
- Do not give this medicine to a child younger than 12 years old without medical consultation.
- If your symptoms do not improve after 3 days of treatment, stop taking this medicine and call your doctor.

Other medicines and PHENYLEPHRINE drops:

- Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines.

Pregnancy, breast-feeding, and fertility:

- Do not use this medicine without a doctor's advice if you are pregnant or you are breast-feeding a baby.

3. How to use PHENYLEPHRINE drops

Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to use

Children 6 to 12 years: 2-3 drops of 0.25% solution in each nostril every 4 hours as needed.
Adults and children over 12 years: 2-3 drops of 0.25% or 0.5% solution in each nostril every 3 to 4 hours as needed.

Instructions for use in the nose

1. Wash your hands well before use.
2. Blow your nose gently.
3. Drop the required number of drops into each nostril.
4. The aim is to get the liquid to spread over all the inside surface of the nose, including the upper surface.
5. A good position is to lie on a bed with your head hanging back over the edge. Stay like this for two minutes after putting in the drops before getting up. This is to ensure that the liquid does not immediately run out of your nose or down the back of your throat but stays in the nasal cavity for a while.
6. Kneeling or bending forwards is an alternative, but it is harder to stay like this for two minutes after putting in the drops.
7. Replace the cap on the bottle after use.
8. Wash your hands after using the drops.

If you use more PHENYLEPHRINE drops than you should:

If you are at all concerned that you have used too much of this medicine contact your doctor or pharmacist.
PHENYLEPHRINE drops are for external use only.

If you forget to use PHENYLEPHRINE drops:

Use a single drop as soon as you remember and then go back to your regular dosing routine. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing routine. Do not use a double dose to make up for the ones missed.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody experiences them.
If you experience any of the following side effects you should tell your doctor immediately. These are symptoms of an allergic reaction. Get emergency

medical help if you have signs of an allergic reaction: hives, difficult breathing, or swelling of your face, lips, tongue, or throat.

PHENYLEPHRINE may cause serious side effects. Stop using phenylephrine nasal and call your doctor at once if you have: Feeling short of breath, chest pain, fast or uneven heartbeat, burning, itching, runny or irritated nose, blurred vision, tremors, headache, dizziness, nausea, heavy sweating, drowsiness, and general weakness.

Common side effects of PHENYLEPHRINE may include:

- Sneezing, burning or stinging nose irritation, runny nose, headache, dizziness, weakness.
- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. How to store PHENYLEPHRINE drops

- Store PHENYLEPHRINE drops in the original container away from direct light. Store below 30 °C.
- Keep this medicine in a safe place where children cannot see or reach it.
- Throw away the bottle after 4 weeks of first opening.

6. Contents of the pack and product description

What PHENYLEPHRINE drops contain:

The active substance is phenylephrine hydrochloride 0.25% and 0.5% w/v. The other ingredients are benzalkonium chloride, sodium chloride, trisodium citrate dihydrate, citric acid anhydrous, and water for injection.

What PHENYLEPHRINE drops look like and the contents of the pack:

PHENYLEPHRINE drop is a clear and colorless liquid supplied in a 10mL bottle with a screw cap.