

کرومولین

۲ درصد

قبل از مصرف دارو، بروشور را به دقت مطالعه کنید.

موارد مصرف دارو:

دسته دارویی: پایداریکننده ماست سل
شکل دارویی: قطره استریل چشمی
جهت پیشگیری، تسکین و درمان
حساسیت‌های چشمی، از جمله گوزنگزیوت
آلرژیک حاد و مزمن و موارد شدیدتر مانند
کراتوکونژکتیویت بهاره.

مکانیسم عملکرد **کرومولین** کمک به کاهش
بروز علائمی مانند خارش، قرمزی، آبریزش،
التهاب ملتحمه و تورم پلک‌ها در اثر
پایداریسازی ماست‌سل‌ها، مهار آزادسازی
هیستامین و سایر واسطه‌های التهابی و
آلرژیک می‌باشد.

راهنمای‌های عمومی:

کرومولین برای بیماری فعلی شما تجویز شده
است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا
توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

مشق‌ها:

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه
است.

در صورتی که درپوش ظرف قبلاً باز شده
است، از مصرف آن جدا خودداری نمایید.

قبل از مصرف، لنزهای تماسی را از چشم خارج
نمایید.

موارد احتیاط و منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به
کرومولین یا هر یک از مواد جانبی ذکر شده
در بخش مشخصات دارو با پزشک خود
مشورت نمایید.

در صورت استفاده از پماد چشمی یا سایر
قطره‌های چشمی، حداقل باید ۵ دقیقه فاصله
زمانی بین مصرف دو فرآورده در نظر گرفته
شود. پمادهای چشمی باید در مرحله آخر
مصرف شوند.

این قطره حاوی بنزالکونیوم کلراید می‌باشد.
این ماده منجر به تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم
شده، بنابراین پیش از مصرف قطره، لنز را خارج
نموده و حداقل ۱۵ دقیقه پس از استفاده از
قطره مجدداً از لنز استفاده کنید.

به دلیل احتمال تاری دید، بلافاصله پس از
مصرف قطره تا برگشتن دید کامل، از رانندگی
و کار با ماشین‌آلات بپرهیزید.

مصرف با بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری و یا تصمیم برای باردار
شدن پیش از مصرف **کرومولین** از پزشک یا
داروساز خود مشورت بخواهید.
مصرف **کرومولین** در دوران شیردهی توصیه
نمی‌گردد.

حداکثرات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها، حتماً پزشک
خود را مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌کند،
اما مقدار مصرف معمول **کرومولین** به شرح زیر
است.
روزانه چهار تا شش بار، هر بار یک تا دو قطره
در چشم مبتلا بچکانید.

نحوه صحیح مصرف دارو:

پیش از مصرف قطره دستان خود را بشویید.
پس از باز کردن درپوش بطری، بطری را بین
انگشت شست و انگشت وسط نگه داشته،
کمی سر را به عقب متمایل کرده، با انگشت
تعمیز، پلک چشم را پایین کشیده و به آرامی به
انتهای بطری فشار وارد نمایید. (مطابق شکل).



قطره را در حفره به وجود آمده بین پلک و
چشم بریزید. نوک بطری را نزدیک چشم برده
اما مراقب باشید با سطح چشم، پلک و اطراف
آن برخورد نکند زیرا احتمال آلوده شدن قطره
وجود دارد.

در حالیکه به سمت پایین نگاه می‌کنید چشم
را به آرامی ببندید.

به مدت ۳ تا ۵ دقیقه به کمک انگشت
شست، گوشه چشم را به آرامی فشار دهید.
چشم را بسته نگه‌دارید و در این فرصت داروی
اضافی خارج شده از چشم را با دستمال پاک
کنید.

درپوش بطری را بلافاصله پس از استفاده
محکم ببندید.
در صورت استفاده پیش از مقدار تجویز شده،
چشم‌ها را با آب گرم شستشو دهید.

در صورت فراموشی هر نوبت از دارو، به محض
یادآوری آن از مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان
نوبت بعدی فرا رسیده بود، مطابق روال قبل
دارو را مصرف نموده و مقدار آن را دو برابر
نکنید. در صورت بروز علائم بهبودی مصرف
دارو را تا پایان دوره درمان متوقف نکنید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات آثار درمانی ممکن است
باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد،
اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده
نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض زیر یا عوارضی غیر از
آنجکه در برگه راهنما قید گردیده است دارو را
قطع و با پزشک، داروساز یا مراکز درمانی
تماس بگیرید.
واکنش‌های آلرژیک از جمله سوزش، خارش،
قرمزی، آبریزش و خشکی چشم، تورم یا
احساس گزش گذرا در چشم، تورم پلک و گل
مژه، تاری دید موقت.

هراید نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه
سانتی‌گراد نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت
نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری
نمایید.
حداکثر زمان نگهداری دارو پس از باز شدن
چهار هفته است.

مشخصات دارو:

هر ۱ میلی‌لیتر از محلول قطره استریل چشمی
حاوی ۲۰ میلی‌گرم ماده مؤثره کرومولین سدیم
می‌باشد. سایر مواد جانبی شامل بنزالکونیوم
کلراید، سدیم کلراید، دی‌سدیم ادتات، پلی
سوربات ۸۰ و آب قابل تزریق می‌باشد هر جعبه

حاوی ۵ میلی‌لیتر محلول در یک بطری
۵ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان و بروشور
استریل می‌باشد.



ساخت شرکت داروسازی نوآوری زیستی
البرز - ایران

INOCOLON